

三甲评审“应知应会”考试——医疗组（五）

一、单项选择题（共 30 题，每题 2 分）

1、预检分诊、发热门诊与感染性疾病科门诊医务人员应采用（ A ）。

A. 一级防护 B. 二级防护 C. 三级防护 D. 以上均不正确

2、二级防护适用于医务人员从事与疑似或确诊患者有密切接触的诊疗活动，是指（ A ）。

A. 穿戴一次性工作帽、一次性外科口罩(接触有流行病学史的戴 N95 防护口罩)、工作服、隔离衣,必要时戴一次性乳胶手套

B. 穿戴一次性工作帽、防护眼镜或面罩(防雾型)、医用防护口罩、防护服或隔离衣、一次性乳胶手套,一次性鞋套

C. 穿戴一次性工作帽、戴医用防护口罩、防护面罩(或全面型呼吸防护器或正压式头套)、防护服或隔离衣、一次性乳胶手套,一次性鞋套

D. 以上均不正确

3、我院医务人员职业暴露报告处理流程，以下不正确的是（ B ）

A. 立即进行局部处理（由近心端向远心端挤）

B. 报告医院感染管理科(给予评估及指导进一步处理)

C. 报告公共卫生管理科(给予评估及指导进一步处理)

D. 填写“职业暴露登记表”建立档案→血清学追踪随访

4、对收治多重耐药菌感染患者和定植患者的病房（C）

A. 可同时收治不同耐药菌感染病人

B. 不必使用专用物品进行清洁和消毒

C. 应当使用专用物品进行清洁和消毒

D. 经患者同意可挂隔离标识

5、完成对多重耐药菌感染患者或者定植患者的诊疗护理操作后，必须做的哪项是错误的？（D）

- A. 及时脱去手套
- B. 及时脱去隔离衣
- C. 及时进行手卫生
- D. 以上都无必要

6、加强抗菌药物的合理应用，以下哪种说法是错误的？（A）

- A. 执行抗菌药物临床应用的基本原则
- B. 正确、合理地实施抗菌药物给药方案
- C. 加强抗菌药物临床合理应用的管理
- D. 减少或者延缓多重耐药菌的产生

7、以下多重耐药菌与代码不正确的是哪一个（D）。

- A. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)
- B. 耐万古霉素肠球菌(VRE)
- C. 产超广谱 β -内酰胺酶 (ESBLs)
- D. 多重耐药菌 (MRSA)

8、《医院感染管理办法》中规定，医疗机构应当严格按照什么加强抗菌药物临床使用和耐药菌监测管理。（A）。

- A. 《抗菌药物临床应用指导原则》
- B. 《消毒管理办法》
- C. 《传染病防治法》
- D. 《执业医师法》

9、住院患者治疗性使用特殊级抗菌药物前微生物标本送检率应不低于（D）。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%
- D. 80%

10、导管相关尿路感染置管时间大于（A）者，宜持续夹闭，定时开放。

A. 3 天 B. 5 天 C. 7 天 D. 14 天

11、可通过直接接触患者或被污染的物体表面时获得，随时通过手传播，与医院感染密切相关的是。（ A ）

A. 暂居菌 B. 常驻菌 C. 病毒 D. 支原体

12、速干手消毒的时间为（ A ）

A. 20-30s B. 40-60s C. 1min-2min D. 以上均不正确

13、手部皮肤有破损，在进行静脉抽血操作时，应佩戴下列哪一类（ D ）

- A. 单层无菌乳胶手套
- B. 单层清洁乳胶手套
- C. 双层聚乙烯或 PE(一种薄型塑料手套)
- D. 双层清洁乳胶手套

14、医务人员使用酒精速干手消毒液已经成为标准手卫生方法，但接触下列哪种病原体引起的感染病人后，酒精擦手液无效而必须进行流动水洗手？（ C ）

A. 高毒力肺炎克雷白菌 B. 耐万古霉素肠球菌
C. 产毒素艰难梭菌 D. 结核分支杆菌

15、哪个科室负责全院重症医学患者的救治？（ A ）

- A. 重症医学科
- B. 临床科室
- C. 医技科室
- D. 急诊科

16、我院院内床位的统一管理由以下哪个部门负责？（ C ）

- A. 护理部质控科

- B. 后勤保障处综合科
- C. 医务处床位调配中心
- D. 计划财务处收费科

17、手术安全核查中，三次核查的主持者是：

第一次（麻醉实施前）（ B ）

第二次（手术开始前）（ A ）

第三次（患者离开手术室前）（ C ）

- A. 手术医师
- B. 麻醉医师
- C. 病房护士
- D. 巡回护士

18、为确认手术患者信息正确，保障手术患者安全，手术相关各方均应准确核对患者信息，对患者信息的核对方式正确的是（ A ）。

- A. 口头陈述
- B. 默认
- C. 点头或摇头
- D. 打手势

19、住院患者《手术安全核查表》应归入病历中保存；非住院患者《手术安全核查表》由手术室、其他各操作科室负责保存，保存期限为（ B ）。

- A. ≥ 5 年
- B. ≥ 15 年
- C. ≥ 10 年
- D. ≥ 20 年

20、手术部位标识统一用（ A ）笔标记，手术部位标识消毒和铺巾后要清晰可见，便于核对。

- A. 蓝色或紫色医用皮肤标记笔
- B. 红色记号笔
- C. 蓝色记号笔
- D. 黑色记号笔

21、手术标识过程中，体表有皮肤切口的手术，用什么符号标记？
（ A ）

- A. +
- B. -
- C. →
- D. *

22、（ B ）是医院质量管理第一责任人，负责制定医院质量方针与目标，策划医院质量管理，确保质量与安全管理体系所需资源的获得，指挥与协调医院质量管理活动，定期专题研究医疗质量和医疗安全工作。

- A. 党委书记
- B. 院长
- C. 分管医疗副院长
- D. 医务处处长

23、（ C ）是本科室的医疗质量与安全管理工作第一责任人，负责本科室质量与安全管理工作。

- A. 护士长
- B. 质控医生
- C. 科室负责人
- D. 质控护士

24、医院质量与安全委员会及各相关管理委员会能在质量与安全管理中发挥（ C ）作用。

- A. 主导
- B. 辅助
- C. 决策
- D. 参谋

25、医院各主管部门与职能部门能运用（ A ）统计分析质量与安全

指标、风险数据、重大质量缺陷等资料，对质量与安全工作实施监控，并定期总结、分析、反馈，有记录。

- A. 管理工具
- B. 管理方法
- C. 统计学原理
- D. 经济学原理

26、近效期药品指达到或者少于包装标明有效期（ B ）的药品

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 9 个月
- D. 12 个月

27、以下选项中是 I 类切口手术的为（ A ）

- A. 手术不涉及炎症区，不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖道等人体与外界相通的器官
- B. 上、下呼吸道，上、下消化道，泌尿生殖道手术，或经以上器官的手术
- C. 造成手术部位严重污染的手术
- D. 有失活组织的陈旧创伤手术

28、围手术期预防用药的时机为（B ）

- A. 手术当天晨起
- B. 术前 0.5-1 小时
- C. 手术开始后立即给予
- D. 手术结束后立即给予

29、清洁手术的预防用药时间为不超过（B ）

- A. 12 小时
- B. 24 小时
- C. 48 小时
- D. 72 小时

30、特殊管理药品不包括（A ）

- A. 戒毒药品
- B. 麻醉药品
- C. 精神药品
- D. 放射性药品

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分）

1、医院对多重耐药菌感染控制的培训应做好（AD）

- A. 对医务人员必须进行相关内容培训
- B. 对患者及家属可不必进行相关培训，以减少医疗纠纷
- C. 保洁人员因不直接接触病人，不必进行培训
- D. 提高医务人员防控技能，保障医疗安全

2、多重耐药菌预防与控制措施包括（ ABCD ）

- A. 加强医务人员手卫生
- B. 对感染患者实施接触隔离（医生下接触隔离医嘱，并写病程记录，悬挂隔离标识，配备手消毒液）
- C. 做好标准预防，加强个人防护
- D. 根据临床微生物检测结果，合理选择抗菌药物

3、呼吸机相关肺炎的核心预防策略包括（ABCD ）

- A. 应每天评估呼吸机及气管插管的必要性。
- B. 若无禁忌症应将患者头胸部抬高 30-45 度, 并应协助患者翻身拍背及震动排痰。
- C. 应使用有消毒作用的口腔含液进行口腔护理，6-8 小时 1 次
- D. 操作时应严格遵守无菌技术操作规程

4、导管相关血流感染的核心预防策略包括（ BC ）。

- A. 不必每日评估留置导管的必要性
- B. 严格遵守无菌技术操作规程, 采取最大无菌屏障
- C. 导管辅料处保持清洁干燥，导管接头消毒时间达 15 秒
- D. 置管部位宜选择股静脉

5、为防止针刺伤，需要做到（ ABCD ）。

- A. 锐器使用后应立即放入盒内
- B. 张贴提示语
- C. 锐器盒放置的位置醒目且方便使用
- D. 不要将针头等锐器面对自己或他人

6、关于医用防护口罩下列正确的是（ ABCD ）：

- A. 呼吸道传染病患者带呼吸阀的 N95 口罩可引起其他人感染
- B. KN95 是中国标准医用防护口罩
- C. 佩戴医用防护口罩时，单手托住口罩，先戴下带、后戴上带
- D. 摘脱医用防护口罩时，双手拉住系带，先取下带、后取上带

7、对于医护人员的手有哪些特殊要求（ ABCD ）：

- A. 指甲长度不应超过指尖
- B. 不应戴戒指等饰物
- C. 不应戴人工指甲、涂指甲油等
- D. 手部皮肤破损工作时应戴双层乳胶

8、根据国家《新冠肺炎防控（第六版）》新冠肺炎传播途径和可能的传播途径包括：（ ABCD ）

- A. 飞沫传播；
- B. 接触传播；
- C. 高浓度长时间气溶胶暴露
- D. 尿液、粪便形成的气溶胶

9、不是治疗过敏性休克的首选药物是（ ABCD ）

- A. 糖皮质激素
- B. 扑尔敏
- C. 阿托品
- D. 去甲肾上腺素
- E. 肾上腺素

10、不是合理用药的临床基础是（ ACDE ）

- A. 正确调配
- B. 正确诊断
- C. 正确服药
- D. 严格审方
- E. 正确给药

11、三度房室传导阻滞的心电图特点是(BC)

A. P 波频率后于 QRS 波群频率

B. P 波与 QRS 波群无固定关系

C. QRS 波群形态取决于心室起搏点位置的高低

D. P-R 间期固定

12、心肌梗塞的部位： II、III、aVF (C)，V1—V6 (B)。

A. 前间壁

B. 广泛前壁

C. 下壁

D. 高侧壁

E. 正后壁

13、下列哪项提示 P 波异常？ (CE)

A. II 导联 P 波直立

B. III 导联 P 波双向

C. aVR 导联 P 波直立

D. aVL 导联 P 波不明显

E. V5 导联 P 波倒置

14、根据《抗菌药物分级管理制度》，根据抗菌药物的安全、经济、疗效细菌耐药性等，将抗菌药物分为 (ABC)

A. 非限制级使用 B. 限制级使用

C. 特殊级使用 D. 特殊限制级使用

15、下列属于特殊使用级的抗菌药物是 (ACD)

A. 美罗培南 B. 舒巴坦 C. 万古霉素 D. 利奈唑胺

16、下列抗菌药物中，主治医师可开具的是（BD）

A. 美罗培南 B. 头孢硫脒 C. 万古霉素 D. 头孢替安

17、医务人员在下列哪些情况下应当洗手（ABCD）

A. 直接接触病人前后

B. 接触特殊易感病人前

C. 接触不同病人之间

D. 摘手套后

18、“两前三后”中的分别指的是（BC）

A. 接触病人前，接触病人环境前

B. 接触病人前，清洁无菌操作前

C. 接触病人后，接触病人环境后，接触病人体液、血液后

D. 接触病人后，下班后，接触病人家属后

19、什么情况下必须先用流动水冲净双手，然后再使用手消毒剂消毒双手？（ABC）

A. 手被感染性物质污染时

B. 处理传染病病人污染物之后

C. 直接为传染病病人进行检查、治疗、护理时

D. 为病人进行身体检查前

20、关于应戴手套的描述正确的是？（ABC）

A. 进行侵入性操作时应当戴无菌手套

B. 戴手套前应当洗手

C. 摘手套后应当洗手

D. 若不是无菌操作不同病人之间可以不换手套